

Fecha de actualización Septiembre 2018

## 1 COMPROBAR INCONSCIENCIA ..... Estimular al niño con suavidad

¿RESPONDE? **NO** **SÍ**

GRITAR PIDIENDO AYUDA (si hay más de un reanimador, llamar al 112)

1. Dejar al niño en la posición en la que se ha encontrado, salvo que esté en peligro.
2. Comprobar su estado y pedir ayuda según sea la situación.
3. Reevaluar de forma periódica.

## 2 ABRIR LA VÍA AÉREA ..... Maniobra frente mentón

¿RESPIRA? **NO** **SÍ**



Ver, oír, sentir



Cabeza en posición neutra

## 3 VENTILAR ..... Dar 5 insuflaciones

Si el pecho del bebé se eleva menos de 2 veces, modifique la posición del cuello. Si no se eleva aún así: pensar en obstrucción de vía aérea.




## 4 COMPROBAR SIGNOS VITALES

Comprobar si existe algún tipo de movimiento, tos o emite sonidos. **NO** **SÍ**


Continuar con las respiraciones hasta que recupere la respiración normal.

## 5 MASAJE CARDIACO

Se deberá comprimir 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Si hay dos reanimadores, uno se encargará de las respiraciones, y el otro dará el masaje con los dos pulgares, abrazando el tórax



Si hay un reanimador



Si hay dos reanimadores

30 COMPRESIONES (Ritmo 100-120 compresiones/min)  
2 VENTILACIONES

## 6 PEDIR AYUDA

Llamar al 112 tras un minuto de RCP (si no se ha hecho antes y continuar RCP)