

La OMS suspende la administración de hidroxiclороquina en ensayos clínicos sobre COVID-19 por razones de seguridad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la administración de hidroxiclороquina y cloroquina como una de las ramas de tratamiento del *Ensayo de Solidaridad Global* en pacientes con COVID-19 en espera de una revisión de los datos de seguridad por parte de la Junta de *Monitorización de Seguridad de Datos* del propio estudio, dijo el Director General de la OMS, Tedros Adhanom, el 25 de mayo. Los otros fármacos incluidos en el ensayo continúan activos.

El estudio compara cuatro opciones de tratamiento comparándolos con el tratamiento estándar, para evaluar su efectividad contra la COVID-19. Específicamente, el ensayo está evaluando el remdesivir un antiviral experimental, la combinación de medicamentos contra el virus del sida (VIH) lopinavir / ritonavir, interferón beta-1a, que se usa para tratar la esclerosis múltiple. En el ensayo también habían sido incluidos los antipalúdicos cloroquina e hidroxiclороquina, ahora retirados del ensayo por sus efectos secundarios.

Hasta ahora, más de 400 hospitales en 35 países están reclutando participantes habiendo sido ya inscritos cerca de 3500 pacientes de 17 países.

Responsables de la OMS citaron los resultados de un análisis publicado el 22 de mayo en *The Lancet* que incluyó a casi 15,000 personas tratadas con hidroxiclороquina o cloroquina. Los autores dijeron que "no pudo confirmarse un beneficio de la hidroxiclороquina o la cloroquina, cuando se usaron solos o asociados a un macrólido (antibiótico del tipo de la azitromicina), en los resultados hospitalarios de COVID-19", y agregaron que "estos regímenes farmacológicos se asociaron con una disminución de la supervivencia intrahospitalaria y una mayor frecuencia de arritmias ventriculares severas".

Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, dijo que no han surgido señales de alerta en el *Ensayo de Solidaridad* que sugieran algún problema, pero que la decisión de suspender temporalmente la rama de la hidroxiclороquina se tomó por "precaución" en vista del aumento de las tasas de mortalidad intrahospitalaria y la presencia de arritmias cardíacas severas presuntamente vinculadas a la administración de la hidroxiclороquina. Mientras tanto, el jefe científico de la OMS, Soumya Swaminathan, afirmó que es importante continuar reuniendo evidencias sobre la eficacia y seguridad de la hidroxiclороquina, y agregó que la decisión de suspender las pruebas en la rama de hidroxiclороquina se revisará en las próximas semanas.

Referencia: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-may-2020>

Fuente: OMS